



Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :
01.01.2013 bis 31.12.2013
Seite 1 - Teil 1
Material : Respirationstrakt
Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger	Escherichia coli	Haemophilus influenzae	Haemophilus parainfluenzae	Pneumokokken (Strept. pneumoniae)	Pseudomonas aeruginosa	Staphylococcus aureus	Staphylococcus aureus (MRSA)			
Penicillin				5,5% (200)		66,8% (1625)				
Oxacillin						0% (1624)	100,0% (331)			
Ampicillin	37,9% (177)	10,2% (500)	5,0% (1563)	5,2% (211)						
Ampi.+Sulbactam	7,9% (177)	2,6% (501)	2,0% (1564)			0,0% (1624)				
Piperacillin	35,7% (154)				3,6% (309)					
Pip.+Tazobactam	4,5% (176)				2,3% (309)					
Cefuroxim	4,5% (177)	2,2% (501)	1,7% (1564)	5,2% (211)		0,0% (1625)				
Cefotaxim	4,5% (176)	0,2% (501)	0,1% (1563)	2,9% (175)						
Ceftriaxon	4,5% (176)									
Ceftazidim	4,5% (177)	0,2% (501)	0,3% (1564)		1,0% (309)					
Gentamicin	4,5% (177)				3,2% (309)	0,9% (1625)	4,3% (324)			
TMP/SMZ	19,2% (177)	26,8% (485)	14,0% (1554)	8,7% (195)		0,6% (1619)	1,9% (324)			
Clindamycin				10,0% (211)		12,4% (1625)	69,0% (323)			
Ciprofloxacin	8,5% (177)	0,6% (501)	2,4% (1564)		4,5% (308)	2,8% (1626)	86,4% (324)			
Moxifloxacin	11,3% (177)	0,8% (495)	3,7% (1563)	0,0% (206)		2,5% (1625)	83,0% (324)			
Imipenem	0,0% (177)				6,1% (309)					
Meropenem	0,0% (177)				2,6% (309)					
Vancomycin						0,0% (1623)				