


**Resistenzen - Vergleich**  
 resistent  
 Niedergelassene Ärzte

 Auswertungszeitraum :  
**01.01.2015 bis 31.12.2015**

Seite 1 - Teil 1

Material : Urine gesamt

Station(en):

**Alle Stationen**

Fachbereich(e):

**Alle Fachbereiche**

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger-Gruppen	Citrobacter spp.	Enterococcus spp.	E. coli	Klebsiella spp.	Proteus spp.	Ps. aeruginosa	Serratia spp.	S. aureus	Koag.-neg. Staph.	Enterobacter spp.
Penicillin		6,2% (1538)						64,6% (175)	80,6% (248)	
Oxacillin								23,3% (176)	38,5% (247)	
Ampicillin	100,0% (146)	3,8% (1538)	43,6% (4012)	100,0% (671)	47,0% (570)		94,3% (35)			98,6% (144)
Ampi.+Sulbactam	58,2% (146)	3,8% (1538)	15,1% (4012)	14,0% (671)	22,3% (570)		94,3% (35)		38,7% (248)	98,6% (144)
Piperacillin	59,6% (146)	3,9% (1521)	43,6% (4012)	99,7% (670)	29,1% (570)	4,5% (202)	17,1% (35)			25,7% (144)
Pip.+Tazobactam						3,0% (199)				
Cefuroxim	52,1% (146)	99,7% (1538)	8,2% (4011)	9,4% (671)	25,3% (570)	100,0% (202)	97,1% (35)		38,7% (248)	82,6% (144)
Cefotaxim						100,0% (196)				
Ceftriaxon						100,0% (196)				
Ceftazidim	17,8% (146)		7,8% (4012)	6,6% (671)	6,5% (570)	2,0% (202)	14,3% (35)			25,0% (144)
Gentamicin	0,0% (146)	100,0% (1525)	5,7% (4012)	3,6% (671)	9,8% (570)	5,4% (202)	8,6% (35)	0,0% (175)	7,7% (248)	4,9% (144)
TMP/SMZ	0,7% (146)	99,9% (1538)	25,5% (4011)	9,7% (671)	32,8% (570)		5,7% (35)	0,6% (175)	8,5% (248)	5,6% (144)
Clindamycin		99,9% (1538)						22,9% (175)	29,0% (248)	
Ciprofloxacin	0,7% (146)	16,5% (1523)	17,9% (4012)	6,1% (671)	14,0% (570)	12,4% (202)	2,9% (35)	38,3% (175)	26,2% (248)	4,2% (144)
Moxifloxacin								38,3% (175)	21,9% (247)	
Imipenem	0,0% (146)		0,0% (4012)	0,0% (671)	77,4% (570)	9,4% (202)	11,4% (35)			0,7% (144)
Meropenem	0,0% (146)		0,0% (4012)	0,0% (671)	0,0% (570)	2,0% (202)	0,0% (35)			0,7% (144)
Vancomycin		0,6% (1538)						0,0% (173)	0,0% (247)	