



## Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :  
01.01.2009 bis 31.12.2009

Seite 1 - Teil 1  
Station(en):  
**Alle Stationen**  
Fachbereich(e):  
**Alle Fachbereiche**

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger-Gruppen	Citrobacter spp.	E. coli	Enterobacter spp.	Enterococcus spp.	Klebsiella spp.	Koag.-neg. Staph.	Proteus spp.	Ps. aeruginosa	S. aureus	Serratia spp.
Penicillin						74,6% (461)			77,2% (3627)	
Oxacillin						29,5% (461)			15,4% (3624)	
Ampicillin	98,1% (270)	45,6% (3937)	98,6% (440)	3,3% (1605)	99,7% (798)		43,8% (979)			99,0% (199)
Ampi.+Sulbactam	48,7% (269)	14,4% (3938)	94,1% (440)	3,2% (1604)	12,3% (798)	28,9% (461)	14,3% (979)		15,4% (3626)	97,5% (199)
Piperacillin	3,0% (270)	35,9% (3938)	10,0% (440)		11,4% (798)		5,4% (939)	2,0% (902)		1,5% (199)
Pip.+Tazobactam	1,1% (270)	0,8% (3937)	3,4% (440)		4,8% (798)		0,5% (979)	1,6% (902)		1,0% (199)
Cefuroxim	51,9% (268)	5,7% (3938)	93,2% (440)		9,4% (798)	28,9% (461)	26,6% (979)		0,0% (3070)	97,5% (199)
Cefotaxim	2,2% (270)	4,6% (3937)	9,1% (440)		5,6% (797)		2,0% (979)			3,0% (199)
Ceftazidim	2,2% (270)	4,5% (3931)	6,2% (438)		4,4% (794)		1,5% (978)	1,0% (902)		2,0% (199)
Gentamicin	0,0% (270)	5,5% (3937)	1,4% (440)	99,8% (1605)	2,8% (798)	13,7% (461)	6,9% (979)	3,3% (902)	1,7% (3627)	1,5% (199)
TMP/SMZ	1,9% (268)	30,5% (3881)	9,1% (438)	22,8% (1595)	11,2% (792)	28,8% (455)	26,1% (960)		0,6% (3597)	16,2% (197)
Doxycyclin	7,2% (265)	34,1% (3913)	11,0% (438)	54,7% (1604)	11,6% (793)	11,5% (461)	90,5% (975)		1,5% (3630)	75,1% (197)
Clindamycin						34,3% (461)			22,7% (3630)	
Ciprofloxacin	0,4% (270)	15,6% (3938)	3,0% (439)	20,4% (1604)	5,8% (797)	31,5% (461)	4,4% (979)	7,6% (902)	18,5% (3627)	7,5% (199)
Levofloxacin	0,4% (270)	15,3% (3937)	2,7% (440)	20,2% (1605)	4,4% (798)	30,2% (461)	3,9% (979)	11,0% (902)	18,3% (3629)	6,5% (199)
Vancomycin				0,6% (1606)		0,0% (60)			0,0% (727)	