



Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :
01.01.2010 bis 31.12.2010

Seite 1 - Teil 1
Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger-Gruppen	Citrobacter spp.	E. coli	Enterobacter spp.	Enterococcus spp.	Klebsiella spp.	Koag.-neg. Staph.	Proteus spp.	Ps. aeruginosa	S. aureus	Serratia spp.
Penicillin						79,1% (494)			75,7% (4098)	
Oxacillin						34,0% (494)			14,1% (4095)	
Ampicillin	100,0% (293)	46,7% (4008)	99,1% (452)	2,1% (1755)	99,6% (846)		43,4% (915)			99,4% (167)
Ampi.+Sulbactam	60,4% (293)	15,8% (4008)	96,9% (452)	2,0% (1755)	11,1% (846)	33,3% (493)	17,7% (914)		10,3% (3927)	97,6% (167)
Piperacillin	17,4% (293)	39,4% (4008)	8,6% (452)		40,4% (846)		12,3% (900)	2,2% (937)		3,6% (167)
Pip.+Tazobactam	1,4% (293)	2,7% (4007)	2,9% (452)		3,0% (846)		1,3% (915)	1,6% (938)		0,6% (167)
Cefuroxim	59,0% (293)	7,0% (4008)	90,2% (451)		8,6% (846)	32,6% (488)	27,6% (914)		0,2% (3532)	98,2% (167)
Cefotaxim	2,7% (293)	5,8% (4006)	5,8% (452)		6,3% (846)		2,7% (915)			1,2% (167)
Ceftazidim	2,4% (293)	5,7% (4000)	4,9% (450)		5,9% (844)		2,7% (914)	1,8% (939)		1,2% (167)
Gentamicin	0,3% (293)	5,1% (4006)	1,1% (452)	99,6% (1750)	3,2% (845)	14,6% (494)	8,1% (914)	3,3% (939)	1,5% (4098)	0,6% (167)
TMP/SMZ	4,1% (291)	31,0% (3960)	6,4% (451)	66,1% (1742)	10,5% (841)	25,9% (487)	29,9% (906)		0,7% (4080)	16,2% (167)
Doxycyclin	3,4% (291)	33,6% (3992)	6,9% (450)	64,1% (1753)	9,4% (844)	20,9% (494)	93,1% (911)		1,7% (4100)	79,6% (167)
Clindamycin						39,4% (493)			22,0% (4097)	
Ciprofloxacin	2,4% (293)	16,5% (4008)	2,0% (452)	18,1% (1722)	6,5% (846)	29,8% (494)	6,9% (915)	5,4% (938)	17,3% (4098)	5,4% (167)
Levofloxacin	2,7% (293)	16,2% (4008)	1,5% (452)	16,8% (1755)	6,6% (846)	29,6% (494)	6,6% (915)	7,8% (928)	17,1% (4099)	4,8% (167)
Vancomycin				0,6% (1764)		0,0% (50)			0,5% (627)	