



Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :
01.01.2012 bis 31.12.2012
 Seite 1 - Teil 1
 Material : nicht
 Harntrakt
 Station(en):
Alle Stationen
 Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

| Antibiotika / Erreger-Gruppen | E. coli | Enterobacter spp. | Enterococcus spp. | Klebsiella spp. | Proteus spp. | Ps. aeruginosa | S. aureus | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Penicillin | | | | | | | 69,3% (4062) | | | |
| Oxacillin | | | | | | | 12,3% (4077) | | | |
| Ampicillin | 36,6% (930) | 99,8% (422) | 1,3% (799) | 99,6% (521) | 45,9% (468) | | | | | |
| Ampi.+Sulbactam | 26,0% (931) | 98,6% (422) | 1,3% (799) | 10,7% (521) | 28,6% (468) | | 0,1% (3580) | | | |
| Piperacillin | 42,6% (47) | 17,6% (17) | | 96,9% (32) | 36,0% (25) | 4,6% (775) | | | | |
| Cefuroxim | 9,1% (931) | 97,6% (422) | | 7,7% (521) | 33,1% (468) | | 0,1% (3581) | | | |
| Ceftazidim | 6,1% (931) | 6,2% (422) | | 3,8% (521) | 6,2% (468) | 6,2% (779) | | | | |
| Gentamicin | 5,4% (930) | 3,3% (422) | 99,9% (792) | 1,2% (521) | 10,3% (468) | 6,7% (779) | 1,7% (4062) | | | |
| TMP/SMZ | 19,7% (926) | 4,5% (419) | 99,0% (799) | 5,4% (519) | 24,0% (466) | | 1,1% (4049) | | | |
| Doxycyclin | 25,9% (931) | 15,7% (421) | 73,2% (799) | 9,2% (521) | 98,7% (468) | 33,3% (3) | 3,9% (4057) | | | |
| Clindamycin | | | | | | | 21,4% (4062) | | | |
| Ciprofloxacin | 10,1% (931) | 4,0% (422) | 13,4% (799) | 5,6% (521) | 9,0% (468) | 10,7% (779) | 16,1% (4062) | | | |
| Levofloxacin | 14,6% (48) | 5,6% (18) | 11,2% (798) | 3,1% (32) | 8,0% (25) | 9,0% (754) | 16,0% (4062) | | | |
| Vancomycin | | | 0,5% (797) | | | | 0,1% (3847) | | | |
| Cefpodoxim | 7,0% (931) | 75,4% (422) | | 4,8% (521) | 18,6% (467) | | 0,8% (3575) | | | |