



Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :
01.01.2012 bis 31.12.2012
Seite 1 - Teil 1
Material : Harntrakt
Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger-Gruppen	S. aureus	Ps. aeruginosa	Proteus spp.	Klebsiella spp.	Enterococcus spp.	Enterobacter spp.	E. coli			
Penicillin	71,0% (200)									
Oxacillin	23,0% (200)									
Ampicillin			47,6% (548)	99,8% (548)	3,0% (1654)	100,0% (139)	46,5% (3612)			
Ampi.+Sulbactam	1,9% (157)		24,5% (548)	20,8% (548)	3,0% (1654)	97,1% (139)	31,3% (3612)			
Piperacillin		4,5% (155)	31,1% (524)	98,3% (522)		23,5% (132)	46,0% (3505)			
Cefuroxim	1,3% (156)		24,8% (548)	16,6% (548)		96,4% (139)	11,4% (3611)			
Ceftazidim		5,2% (155)	5,3% (548)	10,1% (547)		19,4% (139)	7,6% (3609)			
Gentamicin	1,0% (200)	11,0% (155)	14,4% (548)	3,3% (548)	99,9% (1649)	3,6% (139)	6,3% (3612)			
TMP/SMZ	1,0% (200)		32,0% (540)	12,7% (544)	99,0% (1643)	5,1% (136)	29,7% (3575)			
Doxycyclin	4,0% (200)		98,2% (548)	16,4% (548)	73,8% (1654)	27,3% (139)	34,2% (3612)			
Clindamycin	25,0% (200)									
Ciprofloxacin	41,5% (200)	22,6% (155)	15,3% (548)	12,0% (548)	20,8% (1653)	3,6% (139)	18,7% (3612)			
Levofloxacin	41,5% (200)	22,7% (154)	14,9% (525)	11,7% (523)	18,7% (1654)	3,8% (132)	18,7% (3505)			
Vancomycin	0,0% (192)				0,6% (1652)					
Cefpodoxim	0,0% (154)		9,2% (546)	11,3% (547)		74,8% (139)	8,1% (3611)			