



Resistenzen - Vergleich resistent Niedergelassene Ärzte

Auswertungszeitraum :
01.01.2013 bis 31.12.2013
Seite 1 - Teil 1
Material : Harntrakt
Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

Antibiotika / Erreger-Gruppen	Citrobacter spp.	E. coli	Enterobacter spp.	Enterococcus spp.	Klebsiella spp.	Koag.-neg. Staph.	Proteus spp.	Ps. aeruginosa	S. aureus	Serratia spp.
Penicillin				4,9% (1226)		80,1% (231)			72,6% (186)	
Oxacillin						23,7% (228)			19,5% (185)	
Ampicillin	99,3% (153)	45,8% (3660)	99,3% (148)	2,2% (1408)	99,4% (513)		47,8% (557)			100,0% (29)
Ampi.+Sulbactam	56,2% (153)	15,2% (3662)	98,6% (148)	2,1% (573)	14,0% (513)	23,5% (230)	22,3% (557)		0,0% (150)	100,0% (29)
Piperacillin	60,1% (153)	45,5% (3660)	23,6% (148)	2,1% (384)	98,1% (513)		29,4% (557)	3,8% (185)		24,1% (29)
Pip.+Tazobactam								1,7% (180)		
Cefuroxim	55,6% (153)	7,6% (3662)	89,2% (148)	99,8% (1225)	11,1% (513)	23,4% (231)	26,0% (557)		0,0% (150)	100,0% (29)
Cefotaxim										
Ceftriaxon										
Ceftazidim	16,3% (153)	7,2% (3661)	22,3% (148)		7,0% (513)		5,9% (556)	0,0% (185)		20,7% (29)
Gentamicin	0,7% (153)	5,8% (3662)	2,7% (148)	99,6% (570)	2,5% (513)	10,9% (230)	10,6% (557)	4,3% (185)	1,6% (185)	10,3% (29)
TMP/SMZ	2,0% (152)	28,4% (3631)	8,8% (148)	99,7% (1398)	8,6% (512)	14,8% (230)	34,3% (554)		0,5% (185)	6,9% (29)
Clindamycin				99,8% (1226)		24,2% (231)			26,5% (185)	
Ciprofloxacin	3,3% (153)	19,0% (3662)	2,7% (148)	15,5% (1411)	9,6% (513)	28,7% (230)	14,7% (557)	12,4% (185)	41,6% (185)	6,9% (29)
Moxifloxacin						24,0% (217)			39,4% (180)	
Imipenem	0,0% (153)	0,0% (3661)	0,0% (148)		0,2% (513)		23,5% (557)	8,6% (185)		6,9% (29)
Meropenem	0,0% (153)	0,0% (3662)	0,0% (148)		0,0% (512)		0,2% (557)	3,2% (185)		0,0% (29)
Vancomycin				0,7% (1409)		0,4% (231)			0,0% (186)	