


Resistenzen - Vergleich
 resistent
 Niedergelassene Ärzte

 Auswertungszeitraum :
01.01.2016 bis 31.12.2016
 Seite 1 - Teil 1
 Material : nicht
 Nährböden MRSA
 MRSA Screening Abstriche
 Urine gesamt
 Station(en):
Alle Stationen
 Fachbereich(e):

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

| Antibiotika / Erreger-Gruppen | Citrobacter spp. | Enterococcus spp. | E. coli | Klebsiella spp. | Proteus spp. | Ps. aeruginosa | Serratia spp. | S. aureus | Koag.-neg. Staph. | Enterobacter spp. |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Penicillin | | 4,1% (266) | | | | | | 61,7% (2976) | 42,2% (45) | |
| Oxacillin | | | | | | | | 8,7% (3060) | 32,0% (75) | |
| Ampicillin | 100,0% (178) | 2,2% (694) | 39,6% (780) | 100,0% (411) | 50,4% (466) | | 98,6% (145) | 0,0% (1) | 0,0% (1) | 98,2% (380) |
| Ampi.+Sulbactam | 42,3% (175) | 2,2% (694) | 28,2% (780) | 10,5% (411) | 27,0% (466) | | 97,2% (145) | 0,2% (297) | 32,0% (75) | 98,2% (380) |
| Piperacillin | 64,6% (178) | 2,2% (694) | 39,1% (780) | 98,5% (411) | 25,5% (466) | 5,1% (766) | 8,3% (145) | 0,0% (1) | | 8,7% (380) |
| Pip.+Tazobactam | 2,8% (177) | | 9,5% (776) | 4,9% (410) | 2,6% (464) | 4,3% (765) | 1,4% (143) | 0,0% (1) | | 3,5% (371) |
| Cefuroxim | 39,3% (61) | 100,0% (694) | 10,3% (776) | 5,9% (410) | 13,7% (386) | 100,0% (283) | 100,0% (52) | 0,2% (2796) | 31,6% (76) | 89,1% (128) |
| Cefotaxim | 5,1% (177) | | 7,8% (778) | 2,2% (410) | 3,4% (465) | 100,0% (283) | 4,1% (145) | | 0,0% (1) | 5,3% (380) |
| Ceftriaxon | 5,1% (177) | 100,0% (423) | 7,8% (778) | 2,2% (410) | 3,4% (465) | 100,0% (283) | 4,1% (145) | 5,3% (19) | 0,0% (2) | 5,3% (380) |
| Ceftazidim | 5,1% (178) | | 7,8% (780) | 2,2% (410) | 3,2% (466) | 2,5% (766) | 4,1% (145) | 0,0% (1) | | 5,3% (380) |
| Gentamicin | 0,6% (178) | 100,0% (688) | 5,6% (780) | 0,7% (411) | 8,2% (466) | 3,4% (766) | 0,0% (145) | 2,1% (2977) | 20,0% (75) | 2,6% (380) |
| TMP/SMZ | 1,1% (178) | 47,3% (694) | 19,9% (779) | 4,9% (411) | 28,8% (466) | | 0,0% (145) | 1,6% (2975) | 11,8% (76) | 3,7% (380) |
| Clindamycin | | 100,0% (265) | | | | | | 18,2% (2976) | 35,5% (76) | |
| Ciprofloxacin | 1,1% (178) | 11,8% (694) | 14,9% (780) | 3,2% (411) | 11,4% (466) | 6,1% (766) | 6,9% (145) | 10,5% (2976) | 25,3% (75) | 2,9% (380) |
| Moxifloxacin | 5,6% (177) | 38,1% (21) | 17,7% (776) | 6,9% (408) | 18,1% (465) | | 10,4% (144) | 10,2% (2973) | 19,7% (76) | 6,4% (377) |
| Imipenem | 0,0% (178) | 2,4% (449) | 0,0% (780) | 0,0% (411) | 13,9% (466) | 6,5% (764) | 0,0% (145) | 0,0% (1) | | 0,0% (380) |
| Meropenem | 0,0% (178) | | 0,0% (780) | 0,0% (411) | 0,0% (466) | 2,1% (765) | 0,0% (145) | 0,0% (1) | | 0,0% (380) |
| Vancomycin | | 1,4% (694) | | | | | | 0,0% (2948) | 0,0% (70) | |